

Stoffwechselscreening

Ab der vollendeten 36. Lebensstunde kann und sollten Tests auf angeborene Stoffwechselstörung und Schilddrüsenunterfunktion vorgenommen werden. Dazu wird durch eine Fersenblutentnahme wenig Blut entnommen und an ein spezielles Stoffwechsellabor versandt. Sie erhalten nur dann eine Benachrichtigung, wenn ein auffälliges Ergebnis vorliegen sollte. Wenn Sie nach 2 Wochen keine Rückmeldung erhalten haben, ist von einem Normalbefund auszugehen.

U2

Die zweite Vorsorgeuntersuchung Ihres Kindes, die auch im gelben Vorsorgeheft das sie bei Entlassung erhalten werden, dokumentiert wird, kann ab einem Alter von 48 Lebensstunden durchgeführt werden. Sie werden dabei auf die Durchführung der Vorbeugemaßnahmen gegen den plötzlichen Kindstod und die Vitamin-D Gabe zur Rachitisprophylaxe hingewiesen.

Transkutane Bilirubinmessung

Bei Kindern mit Neugeborenenengelbsucht messen wir die Höhe des gelben Blutfarbstoffes über eine Hautsonde. Hiermit ersparen wir Ihrem Kind eine Blutentnahme.



Herzlichen Glückwunsch zur Geburt Ihres Kindes

In diesem Merkblatt haben wir einige Informationen für Sie zusammengestellt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an uns.

Ihr Team der PG 21b

Informationen zu unserer Station

Besuchszeiten

Unsere Mamis brauchen auch mal ihre Ruhe. Bitte beachten Sie deshalb unsere Besuchszeiten. Diese sind von 15:00 bis 18:00 Uhr, Väter und Geschwister sind zu jeder Tageszeit willkommen.

Bistro/Essen

- >> Frühstück von 7:30 bis 9:30 Uhr
in Buffetform ausschließlich für Patientinnen und aufgenommene Begleitpersonen im Familienzimmer.
- >> Mittagessen 11:45 bis 12:45 Uhr
(am Wochenende von 12:15 bis 13:15 Uhr)
- >> Abendessen von 17:15 bis 18:15 Uhr
(am Wochenende von 17:00 bis 18:00 Uhr)
- >> Ein Spender für Wasser (mit und ohne Kohlensäure) sowie für heißes Wasser befindet sich ebenfalls im Bistro.
- >> Kannen mit heißem Wasser erhalten Sie auf Wunsch von uns.

Babysmile Babyfotograf

Alle Neugeborenen können hier im Haus professionell fotografiert werden.

Stillzimmer

Unser Stillzimmer befindet sich direkt neben dem Wickelzimmer. Hier finden Sie immer Ruhe zum Stillen.

Übergabezeiten

- >> Morgens 6:30 bis 7:00 Uhr
- >> Mittags 13:00 bis 14:00 Uhr
- >> Abends 20:15 bis 20:36 Uhr

Kinderwagen

Im Flur stehen Kinderwagen für einen Spaziergang für Sie bereit.

Entlassung

- >> Der Aufenthalt nach einer Spontangeburt beträgt 2 bis 3 Tage, nach einem Kaiserschnitt 4 Tage, auf Wunsch kürzer, bei Bedarf länger.
- >> Das Entlassungsgespräch durch den Stationsarzt erfolgt in der Regel einen Tag vor der Entlassung.
- >> Bitte checken Sie am Tag der Entlassung bis 11 Uhr aus.

Im Haupthaus befinden sich eine Cafeteria und ein Kiosk. Dort erhalten Sie Snacks, Getränke, Zeitschriften usw.

Öffnungszeiten Cafeteria

Montag bis Freitag 8:00 bis 19:00 Uhr
Wochenende und Feiertage 10:00 bis 18:00 Uhr

Kinderarzt

Vor der Entlassung wird bei uns die zweite Vorsorgeuntersuchung (U2), durch den Kinderarzt vorgenommen. Diese findet im Wickelzimmer statt. Außerdem wird bei Ihrem Kind der Stoffwechselltest abgenommen, ein Hörtest und die Pulsoxymetrie durchgeführt. Informationen darüber erhalten Sie bei Aufnahme in Ihrem Zimmer vom Pflegepersonal.

Sauerstoffsättigungsmessung

Um schwere angeborene Herzfehler auszuschließen wird zwischen der 12. und 24. Lebensstunde die Messung der Sauerstoffsättigung am Fußchen des Kindes durchgeführt. Diese Messung ist ohne Nebenwirkungen für Ihr Kind. Sollten auffällige Werte gemessen werden, wird in der Kinderklinik eine Ultraschalluntersuchung des Herzens (Echokardiographie) durchgeführt, die eine sofortige Diagnosestellung erlaubt. In der Kinderklinik gibt es einen kontinuierlichen kinder-kardiologischen Bereitschaftsdienst.

Hörscreening

Ab dem 2. bis 3. Lebenstag kann bei Ihrem Kind der Hörtest durchgeführt werden. Dabei wird eine feine weiche Messsonde in den äußeren Gehörgang eingelegt und beim schlafenden Kind für wenige Minuten gemessen. Manchmal ist der äußere Gehörgang durch Fruchtwasserreste oder Käseschmiere verstopft, dann ist diese Messmethode nicht empfindlich genug und sollte nach 1 bis 2 Wochen wiederholt werden.